

CASOS Y TASAS

Periodo 2012-2016


	INCIDENCIA			MORTALIDAD			T.A.: Tasa ajustada por edad a la población mundial estándar expresada en casos por 100.000 % sobre el total de cánceres (excluyendo piel no melanoma) para cada sexo.
	T. A.	Promedio anual	%	T. A.	Promedio anual	%	
Hombres	38.30	938	13,23	19.01	515	11,68	
Mujeres	28.24	952	14,11	12.36	514	14,28	

El cáncer colo-rectal (CCR) es el segundo cáncer más frecuente en Uruguay luego del cáncer de mama, con casi 2000 casos nuevos, y también la segunda causa de muerte por cáncer (luego del cáncer de pulmón) dando cuenta de más de 1000 muertes anuales. Las tasas de CCR, tanto en incidencia como en mortalidad, se ubican internacionalmente en el quintil más alto (Globocan 2018). Aproximadamente un 4% de los uruguayos serán diagnosticados con CCR a lo largo de la vida. La sobrevida relativa (ambos sexos reunidos) a los 5 años es de un 55%.

(*) se excluye en todas estas cifras el cáncer in situ.


TENDENCIAS DE LA INCIDENCIA Y MORTALIDAD

**TENDENCIA RECIENTES DE LA INCIDENCIA EN URUGUAY
CANCER DE COLO-RECTO 2002-2016**



PCAE (o APC): Porcentaje de Cambio Anual Estimado para el período (2002-2016).
(*) PCAE con asterisco es estadísticamente significativo


**TENDENCIA DE LA MORTALIDAD EN URUGUAY
CANCER DE COLO-RECTO 1990-2017**




PCAE (o APC): Porcentaje de Cambio Anual Estimado para el período (1990-2017).
(*) PCAE con asterisco es estadísticamente significativo

El CCR ha mantenido estable sus tasas de incidencia en el período 2002-2016, en tanto que las tasas de mortalidad han tenido un curso divergente en hombres y mujeres. En hombres, la tasa de mortalidad ajustada por edad creció levemente (un 0.3% anual) mientras que en mujeres decreció, también levemente (a un 0.5% anual), durante el período 1990-2017.


Distribución geográfica de la incidencia del cáncer de COLO-RECTO en HOMBRES




Distribución geográfica de la incidencia del cáncer de COLO-RECTO en MUJERES



Distribución geográfica de la mortalidad por cáncer de COLO-RECTO en HOMBRES



Distribución geográfica de la mortalidad por cáncer de COLO-RECTO en MUJERES



DISTRIBUCION POR EDADES

Periodo 2012-2016

MORTALIDAD

Nº DE CASOS EN EL PERIODO

HOMBRES

	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 y más	Sin datos	Promedio anual	TOTAL Período
C18-21 Colo-recto	0	0	0	1	2	4	10	17	28	40	93	153	235	300	398	441	433	419	2	515	2576

TASAS ESPECIFICAS POR EDAD

	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 y más	Tasa Cruda	Tasa Ajustada*
C18-21 Colo-recto	0.00	0.00	0.00	0.15	0.34	0.73	1.72	3.01	5.80	8.25	19.18	35.38	65.55	98.83	170.24	234.51	327.12	488.62	32.56	19.01

INCIDENCIA

Nº DE CASOS EN EL PERIODO

	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 y más	Sin edad	Promedio anual	TOTAL Período
C18-21 Colo-recto	0	1	2	6	8	20	25	56	96	147	233	399	573	675	754	669	591	431	2	938	4,688

TASAS ESPECIFICAS POR EDAD

	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 y más	Tasa Cruda	Tasa Ajustada*
C18-21 Colo-recto	0.00	0.17	0.31	0.90	1.34	3.64	4.29	9.90	19.88	30.32	48.05	92.27	159.84	222.36	322.52	355.75	446.48	502.61	59.25	38.30

*T.A.: Tasa ajustada por edad a la población mundial estándar expresada en casos x 100000.

MORTALIDAD

Nº DE CASOS EN EL PERIODO

MUJERES

	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 y más	Sin datos	Promedio anual	TOTAL Período
C18-21 Colo-recto	0	0	0	1	1	6	2	16	26	47	90	117	162	249	305	404	443	697	2	514	2568

TASAS ESPECIFICAS POR EDAD

	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 y más	Tasa Cruda	Tasa Ajustada*
C18-21 Colo-recto	0.00	0.00	0.00	0.15	0.17	1.06	0.32	2.71	5.06	8.97	17.06	24.26	39.00	66.59	96.87	138.03	180.78	324.98	29.82	12.36

INCIDENCIA

Nº DE CASOS EN EL PERIODO

	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 y más	Sin edad	Promedio anual	TOTAL Período
C18-21 Colo-recto	0	1	6	11	13	25	33	62	101	157	257	354	423	569	636	694	680	739	1	952	4762


TASAS ESPECIFICAS POR EDAD

	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 y más	Tasa Cruda	Tasa Ajustada*
C18-21 Colo-recto	0.00	0.18	0.97	1.70	2.15	4.43	5.35	10.48	19.66	29.95	48.70	73.39	101.84	152.17	202.01	237.11	277.49	344.57	55.29	28.24

*T.A.: Tasa ajustada por edad a la población mundial estándar expresada en casos x 100000.


CÁNCER DE COLO-RECTO: HOMBRES – Periodo 2012-2016

Distribución de las tasas específicas por edad.



CÁNCER DE COLO-RECTO: MUJERES – Periodo 2012-2016


Distribución de las tasas específicas por edad.




PRINCIPALES SITIOS DEL CANCER

Periodo 2012-2016

CANCER EN URUGUAY 2012-2016 PRINCIPALES SITIOS (ordenados por Incidencia)




CANCER EN URUGUAY 2012-2016 PRINCIPALES SITIOS (ordenados por Incidencia)




EN EL MUNDO

GLOBOCAN (IARC-OMS) 2018


INCIDENCIA DEL CANCER DE COLO-RECTO - HOMBRES




INCIDENCIA DEL CANCER DE COLO-RECTO - MUJERES



MORTALIDAD POR CANCER DE COLO-RECTO - HOMBRES



MORTALIDAD POR CANCER DE COLO-RECTO - MUJERES



GLOBOCAN 2018. Graph production: IARC (<http://gco.iarc.fr/today>)
World Health Organization